



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 08-11-20018062

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 5 du 28 Avril 1999
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

POIS

Ces cultures sont en tout début floraison; compte tenu des conditions météorologiques avec pluie et humidité entrecoupées de périodes douces des maladies risquent de se développer; en particulier sur les pois de semences prévoyez de couvrir toute cette phase de floraison par une application en tout début qui sera renouvelée 15 jours après; quelques pucerons sont visibles dans les premières fleurs.

Intervenez avec

Cicero 2 l/ha plus
Best ou Karate K 1.25 l

ORGES

Ces cultures s'échelonnent du stade F1 enroulée au stade épiaison.

Dans notre région la pression de maladies n'est pas très importante; on observe principalement de l'Oïdium et quelques pustules de Rouille naine.

En cas de présence de maladies à des stades F1 enroulée vous pouvez utiliser:

Amistar pro 2 l/ha
sinon du stade F1 étalée à début épiaison intervenez avec
Opus 1 l/ha
Horizon 1 l
Capitole 1.5l (plus performant sur oïdium)

BLES TENDRES

La problématique est la même, les stades sont similaires; les maladies présentes sont l'Oïdium, la Rouille brune et parfois la Rouille jaune principalement sur Victo

En cas de présence de maladies au stade F1 enroulée, vous pouvez utiliser

Amistar pro 2 l/ha
Ogam 1 l
Sinon sur F1 étalée intervenir avec
Capitole 1.5 l
Opus 1 l
Paindor 0.33 l
Horizon 1 l

En cas de découverte de Rouille jaune intervenez quel que soit le stade

BLES DURS

Beaucoup de ces cultures sont au stade F1 étalée.

La Rouille brune, l'Oïdium et à un degré moindre la Septoriose sont présents.

L'Oïdium atteint les feuilles supérieures; la Rouille brune est visible sur F4 et quelques pustules sur F3; les contaminations et l'expression de la maladie vont être maintenant rapides comme cela est très souvent le cas dans notre région; la Septoriose est beaucoup plus discrète et limitée aux feuilles inférieures; pour l'instant nous n'avons pas vu de Rouille jaune sur les blés durs.

Au stade F1 étalée intervenez sur le complexe parasitaire avec

Capitole 1.5 l/ha
si l'oïdium est absent, variétés non sensibles ou persistance d'action d'un Fortress positionné aux alentours du 15 mars, vous pouvez utiliser également

Opus 1 l
Paindor 0.33 l

Pour les variétés plus tardives au stade F1 enroulée utilisez, si pression de maladie importante, Ogam ou Amistar pro, sinon attendez le stade F1 étalée pour vous reporter au schéma ci-dessus.

► POIS semences: protection de couverture début floraison

► ORGES ET BLES TENDRES si maladies stade F1 enroulée strobilurine; F1 étalée à épiaison triazole Attention R.J.

► BLES DURS F1 enroulée Amistar pro-Ogam F1 étalée Capitole (oïdium) Opus-Paindor

DRAF
Service Régional de la protection des Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER
CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Languedoc Roussillon
Directeur gérant: M.FREYDIER
Publication périodique C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582